

## **ОТЧЁТ ПО АПРОБАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ ДЭТА-РИТМ И ДЭТА АП В МУ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г.САЛАВАТ РБ**

За 6 месяцев: октябрь, ноябрь, декабрь 2009 г., январь, февраль, март 2010г

**Цель клинического исследования:** в условиях стандартного поликлинического приёма больных подтвердить эффективность, безопасность, а также определить методические особенности применения антипаразитарного прибора ДЭТА АП и терапевтического прибора ДЭТА РИТМ

### **Длительность и этапы исследования:**

6 месяцев с момента начала курса лечения для отобранных испытуемых. Общая продолжительность до получения предварительных результатов 2 месяца, до получения итоговых результатов - 3 месяца.

### **Количество испытуемых**

48 человек.

### **Критерии отбора испытуемых:**

отобраны дети из малоимущих семей, заражённых энтеробиозом, аскаридозом, лямблиозом, не имеющих средств для медикаментозного лечения. Имеющих сопутствующие заболевания: хр. гастрит, ДЖВП, хр. холецистит, энурез, ВСД.

### **Критерии включения:**

для проведения испытания отобраны пациенты с 5 лет до 14 лет. соответствующие следующим стандартам.

- 1 энтеробиоз- 22
- 2 аскаридоз- 8
- 3. лямблиоз - 16

### **Критерии исключения из исследования:**

Исключений не было.

### Методология исследования:

1. Анализ кала на яглист. простейшие однократно до начала лечения и 3хкратно после лечения.
  2. Анализ крови общий до и после курса лечения.
  3. клинические проявления заболеваний до и после лечения.
- Испытуемые были поделены на 3 группы по 16 человек.

**1-группа** контрольная – проводились стандартные методы лечения с использованием фарм. препаратов и трав, очистительные клизмы.

**2-группа** – монотерапия аппаратами дэта: по схеме терапевтический аппарат Дэта ритм использовался ежедневно в течении 6 дней на режимах активная защита, глубокая очистка, режим почки, дизбактериоз, регуляция кровообращения, перерыв 6 дней и курс повторялся ещё раз и одновременно использовался антипаразитарный аппарат Дэта АП по схеме: 1 раз в 5 дней проводилось лечение по нозологии: аскарида, энтеробиоз, лямблиоз, затем режим лимфа и детокс, очистка крови, дренаж до и после. каждому пациенту проводилось от 4 до 6 сеансов.

**3-группа** сочетались оба метода лечения.

**Результативность:** в 1 группе -48%, 2-группа-86% 3 группа-94% - эффективность лечения.

### Выводы:

1. Отмечается очень высокая эффективность использования сочетанного лечения с использованием аппаратов серии Дэта и медикаментозного лечения в детской практике.
2. Отсутствие побочных результатов при монотерапии аппаратами серии Дэта.
3. Удобное использование аппаратов при терапии.
4. Рекомендуются широкое использование в практике в качестве моно и сочетанной терапии аппараты Дэта-АП и Дэта-Ритм.

Главный врач МУ ДГБ г. Салават РБ \_\_\_\_\_

*Т. Н. Яценко*

Врач-педиатр \_\_\_\_\_

*С. Я. Фаткулина*

